

Dr. med. Stefan Schüller  
Hautarzt / Allergologie  
Stolpmünder Str. 1  
53119 Bonn

## Epikrise der Ekzem-Behandlung und Follikulitis-Behandlung seit 1998 für Patient Herrn Matthias [REDACTED]:

**September 1998 bis Frühjahr 1999:** Exacerbation eines **psoriasiformen endogenen Ekzems** im Gesicht, Steißbereich, Ellenbeugen, Kopf: Betamethoson 1,7mg i.m und 0,01% Triamcinolonacetonid in Ungt. emulsificans aquosum. Anschliessend 2mg Urbason oral ausschleichend und orales Antihistamin (Repeltin Tbl.) Behandlung der **Follikulitis capitilli** mit Minocyclin oral 2x50 mg.

**Sommer 1999-Mitte 2002:** Im Schub orale Therapie mit 2 mg Urbason als Intervalltherapie sowie verdünnte  $\beta$ -Methason-Externa an der Kopfhaut und axillär, sowie **Follikulitis-profunda**-Behandlung mit Minocyclin oral und Ichtoseptal-Lsg.(Capillitium)

**2004 und 2008: Psoriasiformes Ekzem am Kopf und Follikulitiden** (Kopfhaut, facial und an den Armen) : Behandlung lokal mit Chloramphenicol- oder Gentamycinhaltigen Lotionen sowie  $\beta$ -Methasonhaltigen Externa (Ö/W). Minocyclin oral im Schub nach Stressprovokationen.

**Sommer 2008:** 1,7 mg Betamethason i.m. und Triamcinolonacetonid intrafocal (Nacken) wg **pruriginösen Ekzemknoten**. Betamethason-Lotio lokal am Nacken.

**2009: Kopfekzem**-Behandlung mit Betamethason-Lotio und Clobetasol in auswaschbarer W/Ö-Salbe.

**2010:** Kopfhautbehandlung mit Calcipotriol und Betamethason (Xamiol-Gel) sowie **Perianalekzem** mit verdünnter Triamcinolonhaltiger weicher Zinkpaste.

**Frühjahr 2011: Seborrhoisch-mikrobielles Ekzem** und Kopfekzem mit konsekutiver Alopecie (Haarausfall), Balanitis seborrhoica und Perianalekzem: Behandlung mit verdünnten Steroidexterna und Minoxidil-Lsg (5%) Regaine Männer.

**September 2011:** wegen Therapie-Resistenz des seborrhoischen Ekzems Behandlungsversuch mit **MTX** (10mg/Woche). Balanitis seborrhoica: Prednitop-Creme für 6-8 Tage.

**Juni 2012:** Anlässlich einer Kontrolluntersuchung am 28.06.2012 bestand ein mildes seborrhoisches Ekzem am behaarten Kopf mit Rötung und leichter Schuppung. Die pruriginösen Hautveränderungen waren ebenso wie die Follikulitis capitilli abgeheilt.

*Geowave - C am 26.03.2012 aufgetragen,  
im Einfamilien - Reichenhain.  
(2 Etagen + KG)*

27 16 847  
Dr. med. Stefan Schüller  
Hautarzt / Allergologie  
Stolpmünderstraße 1  
53119 Bonn-Tannenbusch  
Telefon 0228 / 66 63 23